

Sucht im Alter : Perspektiven für alternde Süchtige 11 –
12 Juni 2015

Alternde Drogenkonsumenten in Luxemburg und EU Hauptindikatoren im Überblick

Dr Alain Origer, Drogenbeauftragter, Gesundheitsministerium


Sofia Lopes Da Costa, Klinische Psychologin, Nationaler Knotenpunkt Drogenbeobachtungsstelle (PF OEDT), LIH


*‘By 2050,
it is estimated that **every** fourth person in Europe
will be older than 60...’*

Überblick

- Durchschnittsalter der Drogenkonsumenten in Luxemburg (1995 – 2013)
- Altersklassen Substitutionsprogramm (1998 – 2013 / 2008 – 2014)
- Altersklassen Konsumraum (2005 – 2014)
- Durchschnittsalter der Drogentote (1992 – 2013)
- Polizeikontakte (1998 – 2011)
- Drogenkonsumenten über 40 in der EU (2008)
- Drogentote über 40 in der EU (2000 – 2008)
- Diskussion


Durchschnittsalter der Drogenkonsumenten in Luxemburg (1995 – 2013)






PDU (Problematic Drug User or Harmful user) : a pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health, physical or mental. Harmful use commonly, but not invariably, has adverse social consequences [...] WHO Lexicon of Alcohol and Drug terms (Geneva, 1994)


Verteilung der Altersklassen : Substitutionsprogramm (JDH, 1998 - 2013)



Entwicklung des Durchschnittsalter substituierter Patienten (2008-2014) von Allgemeinärzten und Psychiatern




Altersklassenverteilung : Klienten in Substitutionsbehandlung bei Allgemeinärzten und Psychiatern (2008 - 2014)




Source : CNS


Altersklassen der Klienten des Drogenkonsumraums (2005 - 2014)




Durchschnittsalter : Drogentote (Überdosen) 1992 - 2013



Polizeikontakte (1998 - 2011)




Prozentsatz (%) der behandelten Drogenkonsumenten über 40





NB: Data are from 2008, except for Belgium (2005), Spain (2007) and Malta (2006).


Source: Reitox national focal points.

Veränderung des Anteils älterer Drogenkonsumenten in Behandlung in Europa zwischen 2000 und 2008



Prozentsatz (%) gemeldeter Drogenbezogene Todesfälle über 40





Diskussion

- Alle verfügbaren Altersindikatoren zeigen nach oben !
- Mangel an Indikatoren über Ausmass und Gesundheitszustand (körperlich, mental) der Zielgruppe
- Notwendigkeit einer Bedarfsanalyse der Bedürfnisse der Betroffenen (e.g. medizinische Versorgung, betreutes Wohnen, Vermeidung von sozialer Ausgliederung)
- Einschätzung der Anforderungen an das bestehende und das zu erweiternde Versorgungssystem
- Welche Weiterbildungsangebote müssen wahrgenommen oder geschaffen werden ?
- Welche Finanzierungsmodelle sind möglich ?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !

Quellen :

RELIS (Réseau luxembourgeois d'informations sur les stupéfiants)

CNS (Caisse nationale de Santé)

EMCDDA (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addictions)

Police Grand-Ducale

Fragen :

sofia.lopesdacosta@lih.lu

[Researchgate : Sofia Lopes Da Costa](#)

Dokumentation :

www.relis.lu

<http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index50563EN.html>